

## COMPOSICIÓN:

- Magaldrato.
- Simeticona.

## FARMACOCINÉTICA:

- Las moléculas de Magaldrato y Dimeticona no se absorben, por lo que carecen de efectos sistémicos. La cantidad de aluminio y magnesio que la molécula de Magaldrato libera es mínima.

## MECANISMO DE ACCIÓN:

- El Magaldrato eleva el pH existente en la cavidad gástrica, neutralizando el ácido y como consecuencia disminuyendo los efectos agresivos de la pepsina cuya acción es dependiente del pH.
- La Simeticona actúa dispersando y previniendo la formación de burbujas de gases rodeadas de mucosidades reduciendo la tensión superficial de las burbujas.

## INDICACIONES:

- Hiperacidez.
- Esofagitis.
- Reflujo gastroesofágico.
- Gastritis.
- Úlcera.
- Síndrome dispéptico.

## CONTRAINDICACIONES:

- Diabéticos.
- Hipersensibilidad a las sustancias.

## DOSIFICACIÓN:

Adultos:

- 1 o 2 tabletas 4 veces al día.
- 10 mL o 1 cucharada 4 veces al día.

Niños:

- 2-12 años: 40 mg de Simeticona por vía oral cuatro veces al día.
- Mayor 2 años: 20 mg de Simeticona por vía oral 4 veces al día.

Dosis máxima: 240 mg/día

Dosis Ponderal: 1 mL por Kilo de peso

Preferible 20 minutos después de las comidas.

## PRESENTACIONES:

- Tableta masticable: 800 mg de Magaldrato y 40 mg de Simeticona. Caja por 30. Sabor a vainilla.
- Suspensión 800 mg de Magaldrato y 60 mg de Simeticona en 10 mL. Frasco de 200 mL. Sabor a vainilla.
- Suspensión 800 mg de Magaldrato y 60 mg de Simeticona en 10 mL. Frasco de 300 mL. Sabor a vainilla.

