

DIGESTOTAL[®] PANCREÁTICO



CORPORACIÓN
FARMAYALA
Su salud es nuestro COMPROMISO.

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene en tres comprimidos:

Tableta Verde

Pancreatina Premium 148 mg
Simeticona 65%.....40 mg
Excipientes: c.s.p.

Tableta Blanca

Pancreatina Premium 148 mg
Simeticona 65%.....40 mg
Excipientes: c.s.p.

Tableta Amarilla

Pancreatina Premium.....4 mg
Simeticona 65%.....80 mg
Excipientes: c.s.p.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Digestotal Pancreático contiene Enzimas Pancreáticas mas Simeticona. Las Enzimas Pancreáticas poseen actividad sobre las grasas, carbohidratos y proteínas facilitando la digestión y favoreciendo la absorción de los nutrientes. La Simeticona posee acción antifatulenta, actúa destruyendo las burbujas de gas facilitando su eliminación y aliviando las molestias que ocasionan.

Cada cápsula contiene las sustancias activas simples agrupadas en tres comprimidos separados y adecuadamente protegidos, de tal manera que cada uno de ellos puede disolverse y, en consecuencia, ejercer su actividad en condiciones óptimas.

INDICACIONES

Tratamiento de Insuficiencia pancreática exócrina.

Condición asociada con frecuencia, aunque no exclusivamente, a las siguientes enfermedades:

- Fibrosis quística.
- Pancreatitis crónica.
- Cáncer de páncreas.
- Cirugía de derivación gastrointestinal.
- Cirugía pancreática.
- Después de un episodio de Pancreatitis aguda e inicio de alimentación.
- Obstrucción de los conductos pancreáticos o del conducto biliar común.
- Tratamiento de gases y flatulencias.

DOSIFICACIÓN

La dosificación se deberá adaptar a las necesidades del paciente, la gravedad de la enfermedad y el tipo de dieta que lleve.

Se recomienda tomar Digestotal Pancreático durante o inmediatamente después de las comidas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS

Trastornos gastrointestinales leves: ocasionalmente, náuseas, vómitos, flatulencias, estreñimiento y diarrea.

Trastornos dermatológicos: ocasionalmente, erupciones cutáneas.

PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA

Si está embarazada consulte a su médico antes de tomar Digestotal Pancreático. No se prevén efectos sobre el lactante ya que estudios realizados en animales no indican exposición sistémica de la mujer en periodo de lactancia a Enzimas Pancreáticas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han realizado estudios de interacción.

MANIFESTACIONES DE SOBREDOSIS

Dosis muy elevadas de pancreatina pueden estar relacionadas con la presencia de hiperuricosuria e hiperuricemia.

PRECAUCIÓN PARA CONDUCIR VEHÍCULOS Y OPERAR MAQUINARIAS

Es improbable que Digestotal Pancreático afecte a la capacidad de conducir u operar maquinarias.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja x 3 blíster x 10 Cápsulas + prospecto.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.

