

COMPOSICIÓN:

- Cada 1 ml de solución (gotas) contiene:
Acetaminofén 100 mg, Fenilefrina 2 mg y Cetirizina 1 mg
Excipientes C.S.P
- Cada 5 ml de jarabe contiene:
Acetaminofén 325 mg, Fenilefrina 15 mg y Cetirizina 5 mg
Excipientes C.S.P
- Cada cápsula contiene:
 - Acetaminofén 500 mg
 - Fenilefrina 10 mg
 - Cetirizina 5 mgExcipientes C.S.P

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FARMACOCINÉTICA:

- El Acetaminofén se absorbe rápida y completamente por vía oral. Su vida media de eliminación es de 4 horas aproximadamente. Su efecto terapéutico se prolonga hasta por seis horas sin producir irritación gástrica a dosis terapéuticas.
- La Fenilefrina, después de su administración oral, se absorbe de forma irregular siendo, además rápidamente metabolizada. Comienza a actuar dentro de los 30 minutos siguientes a su administración y una dosis de 60 mg tiene una duración de 4 a 6 horas.
- La Cetirizina es rápidamente absorbida con un tiempo máximo de concentración de aproximadamente una hora después de la administración de cualquier presentación oral en adultos. La vida media de eliminación es de 10 horas.

MECANISMO DE ACCIÓN:

- Acetaminofén es un analgésico y antipirético. Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, mediadores celulares responsables de la aparición del dolor. Además, tiene efectos antiinflamatorios.
- Fenilefrina es un potente vasoconstrictor que posee efectos simpaticomiméticos tanto directos como indirectos. Estimula los receptores adrenérgicos de la mucosa nasal causando una vasoconstricción local que reduce el edema nasal y descongestiona la mucosa.
- Cetirizina es un potente agente antialérgico por sus propiedades de bloqueo de receptores H1 periféricos. Controla la fase tardía de la reacción alérgica, ya que impide la degranulación del mastocito, inhibe la migración de eosinófilos y otras células inflamatorias como neutrófilos y monocitos e inhibe otros factores mediadores de la inflamación.

INDICACIONES:

- Malestar general.
- Fiebre.
- Odinofagia.
- Otagias.
- Rinorrea u obstrucción nasal.
- Congestión conjuntival.
- Tos, estornudos.
- En el tratamiento de los síntomas asociados a la rinitis alérgica estacional.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.
Afecciones hepáticas muy severas.
Por contener un simpaticomimético (fenilefrina), está contraindicado en: pacientes con hipertensión grave, con insuficiencia coronaria grave; pacientes en tratamiento con inhibidores de la monoaminoxidasa (MAO), pacientes con presión intraocular o con retención urinaria.

EFFECTOS ADVERSOS:

El Paracetamol es hepatotóxico, aunque en la mayor parte de las ocasiones esta toxicidad es el resultado de una sobredosis o de dosis excesivas administradas crónicamente. Las reacciones de hipersensibilidad pueden manifestarse por urticaria, eritema, rash, y fiebre.

A las dosis recomendadas, la fenilefrina ocasiona pocas reacciones adversas.

La Cetirizina produce pocas reacciones adversas.

DOSIFICACIÓN:

- Gotas: desde los 6 meses hasta menores de 2 años: 2 gotas por kilo de peso cada 12 horas

- Jarabe: 2 a 5 años (menores de 30 kg): 2,5 ml cada 12 horas. 6 a 12 años (mayores de 30 kg): 5 ml cada 12 horas.

-Una cápsula cada 12 horas por el tiempo de 7 a 10 días, dependiendo el cuadro clínico.

Normalmente, el tratamiento no debe prolongarse más de 2 a 3 semanas si es un proceso alérgico crónico.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

ADVERTENCIA:

Producto de uso delicado. Adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA

PRESENTACIONES:

Frasco gotero x 30 ml sabor a banana.

Jarabe x 60 ml sabor chicle y vainilla.

Caja por 30 cápsulas.



Farmayala Medicines