

MOPINAL® COMPUESTO



CORPORACIÓN
FARMAYALA

Su salud es nuestro COMPROMISO.

COMPOSICIÓN

Cada tableta recubierta contiene:
Clonixinato de Lisina 125 mg
Propinox Clorhidrato 10 mg
Excipientes C.S.P.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

MECANISMO DE ACCIÓN

- El Propinox es un antiespasmódico antagonista moderado y no selectivo de los receptores muscarínicos y con acción directa sobre el músculo liso visceral.
- El Clonixinato de lisina es un analgésico antiinflamatorio no esteroide (AINE), con acción analgésica predominante. Su acción se desarrolla por inhibición de la síntesis de prostaglandinas.

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS

- Propinox: Luego de la administración oral la concentración plasmática se alcanza a los 60 minutos. El Propinox presenta una vida media de eliminación plasmática de 4 horas y un volumen de distribución de 2 l/kg. La unión a las proteínas plasmáticas es de 91%.
- La eliminación se hace mediante biotransformación hepática.
- Clonixinato de Lisina: La absorción es rápida obteniéndose la concentración plasmática máxima entre 40 y 60 minutos después de la administración oral. La biodisponibilidad es en promedio de 56%. La vida media plasmática es de 1,75 horas; presenta una elevada unión a las proteínas del plasma (97,4%).
- La eliminación es bajo la forma de metabolitos, principalmente en la orina (60%).

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

- Dolor o cólico por estados espasmódicos del intestino.
- Dolor o cólico de las vías biliares.
- Dolor o cólico por espasmos o litiasis de origen urinario.
- Patologías espásticas del aparato genital femenino, como la dismenorrea.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Úlcera péptica o hemorragia gástrica.
- Antecedentes de broncoespasmo, pólipos nasales, angioedema o urticaria asociados al ácido acetilsalicílico u otros aines.
- Glaucoma, hipertrofia de próstata o retención urinaria.
- Embarazo, lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Epigastralgia, acidez, náuseas, vómitos, sequedad bucal, constipación, mareos, somnolencia, cefalea, palpitaciones o taquicardia.

PRECAUCIONES DURANTE EL EMBARAZO

Contraindicado.

PRECAUCIONES DURANTE LA LACTANCIA

Contraindicado.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS

- Drogas anticolinérgicas ya que puede producirse una sumatoria de efectos.
- Los antiácidos pueden disminuir su absorción.
- Otros antiinflamatorios no esteroideos por aumento de riesgo de complicaciones.
- Diuréticos, aumenta el riesgo potencial de insuficiencia renal aguda. Se deberá hidratar adecuadamente y controlar la función renal.

DOSIFICACIÓN

Adultos y niños mayores de 12 años: Una tableta 3 a 4 veces por día.

ACCIONES A TOMAR EN CASO DE SOBREDOSIFICACIÓN

Luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente, de la valoración del tiempo transcurrido desde la administración y descartando la contraindicación de ciertos procedimientos, podrá utilizarse Neostigmina por vía subcutánea o intravenosa 0,5 mg hasta un máximo de 2 mg.

Los síntomas severos de excitación pueden manejarse con tiopental sódico al 2% en solución por vía intravenosa lenta.

Deben efectuarse siempre medidas de cuidado general, mantenimiento de la vía aérea y la oxigenación, y un adecuado monitoreo de los signos vitales.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano.

ADVERTENCIA

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.

RECOMENDACIONES

Conservar a temperatura menor a 30 °C, proteger de la humedad.
Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA.

PRESENTACIÓN

Caja de 2 blister x 10 tabletas recubiertas + prospecto.



Elaborado por INDEUREC S.A. Durán - Ecuador.



Farmayala Medicines

www.farmayala.com