

TUSSOLVINA FIT[®]



PRINCIPIO ACTIVO:

Cada 10 ml de solución contiene:
Dextrometorfano 20 mg
Guaifenesina 200 mg
Excipientes C.S.P.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FARMACOCINÉTICA:

- La guaifenesina se absorbe fácilmente por el tracto gastrointestinal y, como otros expectorantes, se elimina por vía renal en forma de metabolitos inactivos.
- El dextrometorfano tiene una biotransformación hepática; es fácil y extensamente metabolizado a dextrotrófano (metabolito activo). El inicio de su acción es en una hora y media posterior a su administración, la duración de la acción es de hasta 6 horas y su eliminación es primariamente renal, excretado como dextrometorfano sin cambio.

MECANISMO DE ACCIÓN:

- La guaifenesina o guayacolato de glicerilo es una sustancia semisintética derivada del guayacol fenol, cuya acción expectorante es superior a la del cloruro de amonio, ya que es capaz de aumentar las secreciones del tracto respiratorio en un 121%.
- El dextrometorfano es un antitusivo sintético de acción central, libre de los inconvenientes de los alcaloides del opio, ya que inhibe el eje de la tos.

INDICACIONES:

- Tratamiento de la congestión e inflamación originada por la tos, resfriado, o por infecciones agudas del sistema respiratorio.
- Tos seca y/o tos con flema.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes con hipersensibilidad al fármaco o a alguno de los componentes de la formulación.
No debe administrarse en el embarazo o lactancia ni a menores de 2 años.

EFFECTOS ADVERSOS:

Aunque las reacciones adversas al dextrometorfano son generalmente leves y poco frecuentes, pueden producirse somnolencia, mareos y fatiga con dosis terapéuticas. En raras ocasiones se han reportado erupciones o anafilaxia.
El dextrometorfano se asocia con efectos serotoninérgicos. Dosis excesivas de dextrometorfano por abuso de sustancias (por ejemplo, en combinación con productos que contengan estupefacientes o simpaticomiméticos) puede dar lugar a efectos adversos adicionales que incluyen: confusión,

agitación, nerviosismo, inquietud, irritabilidad, náuseas / vómitos, disartria (dificultad para hablar).

Las siguientes reacciones adversas con la guaifenesina necesitan atención médica sólo si ellas continúan o son molestas: diarrea, mareos, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, rash cutáneo, dolor estomacal, urticaria.

DOSIFICACIÓN:

Niños (2 a 5 años): 2,5 ml cada 6 horas.
(6 a 12 años): 5 ml cada 6 horas.
Adultos y mayores de 12 años: 15 ml cada 6 horas.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C.

ADVERTENCIA:

Producto de uso delicado. Adminístrese bajo prescripción y vigilancia médica.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

PRESENTACIONES:

Frasco de 120 ml con Jarabe sabor a fresa y frambuesa pero endulzado con un edulcorante: sucralosa. Con vaso dosificador.



Biindustria[®]
"Protegemos su salud con calidad"