

SIMETIDIG[®] GOTAS



COMPOSICIÓN:

Cada 1mL de suspensión contiene:

Simeticona... 100 mg

Excipientes c.s.p: Goma Xanthan; Polivinilpirrolidona PVP K30; Metilparabeno; Propilparabeno; Sacarina sódica; Sucralosa; Color rojo # 40; Sabor cereza; Agua purificada.

VIA DE ADMINISTRACION:

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiflatulento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS O DE OTRO GÉNERO:

No se han descrito.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

Problemas de uso durante la gestación no han sido documentados, así mismo problemas de su uso durante la lactancia. Si está embarazada o en período de lactancia consulte a su médico antes de utilizar este producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

No se han descrito.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

No tiene efectos tóxicos.

No se han reportado efectos de intoxicación.

En caso de presentarse alguna reacción acudir al hospital más cercano.

INDICACIONES:

Alivio temporal y sintomático de los trastornos de la digestión. Antiflatulento.

Se indica el uso de Simetidig para el tratamiento de las condiciones en que la retención de gas es un problema. También se usa Simeticona como un agente antiespumante durante la gastroscopía para mejorar la visualización y antes de la radiografía de intestino para disminuir las sombras producidas por los gases.

POSOLOGÍA:

Niños menores a 2 años: 10 gotas 3 ó 4 veces al día, después de sus alimentos.

Niños mayores 2 años y adultos: 10 a 40 gotas cuatro veces al día y antes de acostarse.

Dosis mayores deben ser indicadas por el médico. "Si los síntomas persisten consulte a su médico".

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a la Simeticona o alguno de los componentes de la fórmula.

VENTA LIBRE.

PRESENTACIÓN:

Caja x 15mL de suspensión sabor a cereza.

